

#### Додатак 4

### **ДЕКОНТАМИНАЦИЈА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ (ЛЗО)**

Коришћену/контаминирану ЛЗО у сумњи на COVID 19 паковавати у жуту кесу за инфективни отпад, убацити је у другу чисту жуту кесу за инфективни отпад( дупло паковање) и потом пребацити у жути контејнер. Лице под ЛЗО убацује жути контејнер у возило за медицински отпад, седа са возачем који носи ЛЗО (маску, рукавице и заштитни мантил) и одвози се колима **до просторије за деконтаминацију**. Возило за медицински отпад сачекује друго лице под ЛЗО и помаже при истовару жутог контејнера до просторије за деконтаминацију ЛЗО опреме. У просторији укључити гермицидну лампу. Контејнер изложити 10 мин, дејству УВ зрачења, потом извадити жуту кесу, изложити 10 минута УВ зрачењу, расећи спољашњу жуту кесу, поново изложити 10 мин УВ зрачењу, потом расећи и жуту кесу/прво паковање, изложити 10 мин УВ зрачењу, потом ЛЗО изложити УВ зрачењу. ЛЗО потопити у раствору Санихлора у трајању од 30 мин, дезинфиковати ЛЗО, оставити да се просуши на растегнутој жици, а осушену ЛЗО изложити експозиција 10 мин УВ зрачењу, и поново је користити.

Возило деконтаминирати хлорним препаратом након превоза.

Лице које обавља деконтаминацију је под пуном ЛЗО, а дуга особа под ЛЗО контролише поступак, евидентирајући у чек листе.